

	PREPARACION BIOPSIA DE MAMA		
	Código: I-016	Versión: 2.0	Página 1 de 1

La biopsia guiada por imágenes se lleva a cabo cuando el área anormal en la mama es muy pequeña para sentirse, lo que dificulta la localización de la lesión por tacto (llamada palpación). Una biopsia de mama se lleva a cabo para extraer algunas células, a través de un procedimiento menos invasivo que implica el uso de una aguja hueca, de un área sospechosa de la mama para examinarlas bajo microscopio y determinar si existen células malignas o no. La biopsia de aguja guiada por imágenes no se destina para remover la lesión. El procedimiento tiene una duración aproximada de 15 minutos.

REQUISITOS GENERALES:

- Si toma antiagregantes o anticoagulante plaquetarios (ASA-Aspirina, Asawin, Aspirineta, Warfarina o Coumadin), se deben suspender 10 días antes del examen. Consulte a su médico sobre la seguridad de hacerlo.
- Copia de la orden autorizada por la aseguradora y copia de la historia clínica.
- Si toma otros medicamentos **NO** suspenderlos el día del examen.
- Traer los estudios anteriores recientes, relacionados con el examen que se va a realizar (ecografías de mama, mamografías).

EL DIA DEL EXAMEN

- ✓ Presentarse 15 minutos antes de la hora de la cita.
- ✓ Traer la orden autorizada por la aseguradora, historia clínica y estudios previos (ecografías seno o mamografías). Sin estos documentos no se realiza el estudio.
- ✓ Debe venir con ropa cómoda (dos piezas).
- ✓ Informar al personal de enfermería los medicamentos que consume.

CUIDADOS DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO:

- ✓ Las instrucciones para cuidados posteriores varían, pero generalmente usted puede reanudar las actividades normales y cualquier vendaje o apósito puede ser removido en unas pocas horas.
- ✓ El sitio de la biopsia puede quedar dolorido y sensible por uno o dos días. Según el caso el médico le indicará el analgésico más adecuado para evitar y aliviar el dolor.
- ✓ Consultar al especialista **si** después del procedimiento presenta algunos de los siguientes signos: color, calor, hematoma en el sitio de la punción, fiebre y/o sangrado excesivo.